

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.


Our team does not own copyrights for the most content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to be in contact with all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.


Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.




Contrôle neuroendocrinien de l'appareil reproducteur



Pr A. BOUAZIZ



1. Variations des taux plasmatiques des hormones hypophysaires et ovariennes pendant le cycle menstruel



A. Bouaziz

- le premier pic de la FSH (7^{ème} jour) provoque l'apparition du premier pic des œstrogènes au 11^{ème} jour du cycle;
- le deuxième pic de la FSH (13^{ème} jour) provoque l'apparition du deuxième pic des œstrogènes au 21^{ème} jour du cycle;
- Le pic de la LH (13^{ème} jour) est à l'origine de l'apparition du pic unique de la progestérone au 21^{ème} jour; et
- L'action combinée de la FSH et de la LH (13^{ème} jour) déclenche l'ovulation au 14^{ème} jour du cycle.


2. Transport des hormones ovariennes

S.B.P. Elle transporte les œstrogènes + la testostérone + la progestérone.


C.B.G. Elle transporte les corticostéroïdes.

Transcortine. Elle transporte essentiellement la progestérone.


3. Modifications cycliques de l'appareil reproducteur ♀



3. 1. Modifications cycliques de l'épithélium de la trompe de Fallope



Coupes transversales dans différentes régions de l'oviducte



Épithélium de l'oviducte

Lumière de l'oviducte


Grossissement

Mucus

Cils

Cellule ciliée

Cellule caliciforme



Épithélium de revêtement de l'oviducte haut et cilié

Bouaziz


Pendant les règles : l'épithélium de la trompe est bas, présentant des cellules ciliées rares.

Pendant la phase pré-ovulatoire (oestrogénique) : l'épithélium devient haut, les cellules ciliées réapparaissent.


À l'ovulation : l'épithélium garde la même forme, et les cellules ciliées deviennent nombreuses.

Pendant la phase post-ovulatoire (oestro-progéstative) : l'épithélium diminue de taille, et les cellules ciliées restent très actives.

3. 2. Modifications cycliques de l'endomètre



Structure de la paroi utérine du 23^{ème} au 28^{ème} jour du cycle



Sang résultant de la
rupture des
vaisseaux sanguins
de la C.F.E.

Ce qui reste de la paroi utérine juste après les règles (fin 5^{ème} jour)

Du 1^{er} au 5^{ème} jour (phase de desquamation) : c'est la desquamation de la couche fonctionnelle de l'endomètre (couche compacte, couche spongieuse, glandes à glycogène et débris des vaisseaux sanguins). Ce phénomène est provoqué par la chute des taux des œstrogènes et de la progestérone, et ce, suite à la dégénérescence du corps jaune.

Du 6^{ème} au 8^{ème} jour (phase de régénération) : c'est la reconstitution de la couche fonctionnelle de l'endomètre et de l'épithélium utérin.


Du 9ème au 14ème jour (phase de prolifération) : c'est la disposition hélicoïdale des artérioles dans la couche fonctionnelle de l'endomètre.

Du 15ème au 21ème jour (phase de transformation des glandes) : c'est le grand développement des glandes qui se chargent en glycogène. Un léger œdème apparaît dans le tissu conjonctif de la couche fonctionnelle de l'endomètre.

Au 22ème jour (phase d'œdème du tissu conjonctif) : la couche fonctionnelle de l'endomètre est prête pour une éventuelle nidation.

Du 23ème au 28ème jour (phase d'excrétion) : les artères deviennent spiralées et les glandes à glycogènes excrètent le glycogène et le mucus.

3. 3. Variations cycliques des sécrétions cervicales




La quantité de la glaire cervicale subit de nombreuses modifications au cours du cycle menstruel.

Pendant la phase pré-ovulatoire : la quantité de la glaire cervicale est abondante.

Pendant la phase péri-ovulatoire : la glaire cervicale atteint son maximum de synthèse.

Pendant la phase post-ovulatoire : la quantité de la glaire cervicale diminue rapidement puis lentement jusqu'à la fin du cycle.

3. 4. Modifications cycliques de l'épithélium vaginal



C. superficielle à noyaux pycnotiques

C. intermédiaire

C. parabasale

Assise germinative

T. C. Sous jacent

*Épithélium de revêtement pavimenteux stratifié non
kératinisé squameux*

Pendant la phase pré-ovulatoire :
elle correspond à une intense activité mitotique des cellules de la couche basale de l'épithélium vaginal (phase de régénération).

Pendant la phase post-ovulatoire :
elle correspond à la desquamation des couches superficielles de l'épithélium vaginal (phase de desquamation).